

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ОТПУСКАЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА**

**И СОДЕРЖАЩИХ СЕДАТИВНЫЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И/ЛИ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ,
ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

№	Торговое наименование Международное непатентованное наименование	АТХ	Группа	Лекарственная форма	Примечание
1	Корвалол, Валокордин®, Валосердин®, Валосемид Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат	M05CM	Другие снотворные и седативные средства	Капли для приема внутрь, таблетки	Содержит спирт этиловый, фенобарбитал Снотворное лекарственное средство, хорошо растворимое в спирте, с выраженным влиянием на ЦНС

2	ВАЛОСЕРДИН® ТАБ, Корвалол Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат	1G05CM	Другие снотворные и седативные средства	Таблетки	Содержит фенобарбитал - противоэпилептическое, седативное, снотворное средство группы барбитуратов. Снотворное лекарственное средство с выраженным влиянием на ЦНС
3	Афобазол® Фабомотизол	N05BX04	Психолептики; анксиолитические средства; другие анксиолитические средства	Таблетки	Содержит фабомотизол - селективный небензодиазепиновый анксиолитик Возможно развитие седативного эффекта и повышенной сонливости.
4	Йокс®-Тева Аллантоин + Повидон-Йод	K02AA15	Антисептическое средство	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Требуется соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности.
5	Экстракт Грудной эликсир Аммиак + Аниса обыкновенного плодов масло + Солодки корней	K05CA10	Отхаркивающее средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

6	Нашатырноанисовые капли Аммиак + Аниса плодов масло	K05CA10	Отхаркивающее средство	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
7	Аралии маньчжурской корней настойка	A13A	Общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
8	Хофитол® Артишока листьев экстракт	A05AX	Желчегонное средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

9	<p>Дуоколд® Аскорбиновая кислота + Кальция глюконат + Парацетамол + Рутозид + Фенилэфрин и Аскорбиновая Кислота + Кальция Глюконат + Парацетамол + Рутозид + Фенилэфрин + Фенирамин [набор]</p>	Ш02BE51	<p>ОРЗ и "простуды" симптомов Средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых рецепторов блокатор)</p>	<p>Набор порошков ДЛЯ приготовления раствора для приема внутрь</p>	<p>Содержит фенирамина малеат - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений</p>
10	<p>Антигриппин аптекарский Ацетилсалициловая кислота + Аскорбиновая кислота + Рутозид, Дифенгидрамин + Метамизол натрия + Кальция глюконат</p>	K05X	<p>ОРЗ и "простуды" симптомов Средство устранения</p>	<p>Капсулы</p>	<p>Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых Н1- рецепторов первого поколения. Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.</p>
11	<p>Аспирин® Комплекс Ацетилсалициловая Кислота + Фенилэфрин + Хлорфенамин</p>	K05X	<p>ОРЗ и "простуды" симптомов Средство устранения (НПВП + альфа-Адреномиметик + Н1-гистаминовых Рецепторов блокатор)</p>	<p>Порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь</p>	<p>Содержит хлорфезнамин - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.</p>

12	РИНОСТЕЙН® Ацетилцистеин + Туаминогептан	K01AB08	Противоконгестивное средство	Спрей назальный	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
13	Красавки настойка Белладонны листья	B02BA02	Спазмолитическое средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 35-40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
14	Зеленина капли Белладонны настойка + Валерианы лекарственной корневищ с корнями Настойка + Ландыша травы настойка + Левоментол	АОЗЕЭ	Спазмолитическое средство растительного происхождения	Капли для приема внутрь	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
15	АНДИПАЛ АВЕКСИМА, Андипал Бендазол + Метамизол Натрия + Папаверин + Фенобарбитал	Ш02BB72	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолонь	Таблетки	Содержит фенобарбитал – противоэпилептическое, седативное, снотворное средство группы барбитуратов. Снотворное лекарственное средство с выраженным влиянием на ЦНС

16	АНЕСТОДЖЕТ, Строколин® Тонзи, ФАРИНОРМ®, Бензидамин, ОРАЛСЕПТ®, Тантум® Верде, Грин Брин®, Ангидак®, Фарингоспрей, Фарбентум, Тонзинорм®, Звездочка ЛОР, Бронфлекс, АспиСептал Бензидамин	A01AB02	Препараты, применяемые в стоматологии; другие препараты для местного лечения заболеваний в полости рта	Спрей для местного применения дозированный, спиртовой со вкусом ментола, лимона, раствор для местного применения	Содержит спирт этиловый 95% - 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
17	Звездочка Дуо ЛОР, Лоросептин Бензидамин + хлоргексидин	K02AA20	Нестероидный противовоспалительный препарат + антисептическое средство	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
18	СЕПТОФОРТ ТОТАЛ, Септолете® тотал Бензидамин + Цетилпиридиния хлорид	Я02AA20	Препараты для лечения заболеваний горла; другие препараты для лечения заболеваний горла	Спрей для местного применения дозированный	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

19	ТераФлю ЛАР Бензоксония Хлорид + Лидокаин	K02AA20	Антисептическое Средство + местноанестезирующее средство	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
20	Борная кислота	Б>08АБ>	Антисептики и дезинфицирующие средства; препараты борной кислоты	Раствор для местного применения, [спиртовой]	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
21	ИАРДОЛ Борная кислота + Прокаин	B02AA30	Средства для лечения заболеваний уха; противомикробные средства	Капли ушные	Содержит спирт этиловый Токсические реакции в случае применения при перфорированной барабанной перепонке: тошнота, рвота, покраснение кожи, зуд, крапивница, отек, глухота, нарушение равновесия, спутанность сознания.
22	Боярышника плодов настойка	C01EB04	Средства для лечения заболеваний сердца; другие препараты для лечения заболеваний сердца	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

23	СТАБИКАРДИН® Боярышника плодов экстракт + Крапивы двудомной листьев экстракт + Ландыша травы настойка		Кардиотоническое средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
24	Синекод, Панатус®, Панатус® форте, Туссикод®, Омнитус®, Бугамират Бугамират	K05BB13	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; противокашлевые средства, кроме комбинаций с отхаркивающими средствами; другие противокашлевые средства	Раствор для приема внутрь, сироп	Содержит спирт этиловый 95% - 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
25	Релаксозан® Ночь Валерианы лекарственной корневищ с корнями + Мелиссы лекарственной травы + Мяты перечной листьев] экстракт	Ш05СМ	Седативное средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
26	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	Ш05СМ09	Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

27	Зубные капли Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Камфора + Мяты перечной листьев масло	A01AE11	Местно-раздражающее средство	Капли зубные	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
28	КАРНИЛАНД® Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментола раствор в ментилизовалерате + Нитроглицерин	C03AA52	Антиангинальное средство	Капли подъязычные	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
29	Лимановит® Е Витамин Е + Ламинарии слоевищ экстракт	A13A	Общетонизирующее е средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
30	Гексо Бронхо® Гвайфенезин	K05CA03	Отхаркивающее средство	Сироп	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

31	Максиколд® Лор Гексэтидин	A01AB12	Антисептическое средство	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 24-48 мг в суточной дозе Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
32	ФАРИНОРМ® Гексэтидин, Стопангин®-Тева, Стоматидин®, Гелангин® нова, ГЕКСЭТИДИН Гексэтидин	A01AB12	Препараты, применяемые в стоматологии; противомикробные средства и антисептики для местного лечения заболеваний в полости рта	Спрей для местного применения, раствор для местного применения	Содержит спирт этиловый 96 % Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
33	Танакан® Гинкго двулопастного листьев экстракт	N06DX02	Психоаналептики; средства для лечения деменции; другие средства для лечения деменции	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
34	ГЛИЦИН + МЕЛАТ ОНИН ЭВАЛАР Глицин + Мелатонин	M05CX	Снотворное средство	Таблетки подъязычные	Содержит мелатонин, который оказывает снотворное действие. Вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений и нарушений со стороны нервной системы.

35	Перца водяного экстракт жидкий Горца перечного травы экстракт	B02BX	Гемо статическое средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
36	ЭФФЕКС® Красный корень Горца птичьего травы + Копеечника забытого корневищ с корнями настойка	O04BX	Простатита хронического средство лечения растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
37	Граммидин® с анестетиком Грамицидин С + Оксibuпрокаин + Цетилпиридиния хлорид	K02AA20	Антибиотик + антисептическое средство + местноанестезирующее средство	Спрей для местного применения дозированный	Содержит спирт этиловый 96 % Вследствие, наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
38	Граммидин® ГрамицидинС + Цетилпиридиния хлорид	K02AA20	Антибиотик + антисептическое средство + местноанестезирующее средство	Спрей для местного применения дозированный	Содержит спирт этиловый 96 % Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

39	Чаги настойка Гриба березового настойка		Растительного происхождения средство	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
40	Бефунгин Гриба березового экстракт+[Кобальта сульфат]	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
41	Гипоролам Густой экстракт слоевищ ламинарии + сухой экстракт плодов облепихи крушиновидной	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
42	Драмина®, Авиамарин® Дименгидринат	K06AA11	Антигистаминные Средства системного действия; H1 - гистаминовых Рецепторов блокатор	Таблетки	Содержит дименгидринат - блокатор гистаминовых H1-рецепторов первого поколения. Головокружение, сонливость, нарушение концентрации внимания, общая слабость, беспокойство, нервозность, ослабление ночного и цветного зрения, затуманенность зрения, нарушение

43	<p>Пентафлуцин® Дифенгидрамин + Кальция Глюконат + Парацетамол + Рутозид + Аскорбиновая кислота</p>	K05X	<p>ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения</p>	<p>Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь</p>	<p>Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1-рецепторов первого поколения. Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.</p>
44	<p>Левросо® Лонг Дифенгидрамин + Мелатонин</p>	M05CX	<p>Психолептики; снотворные и седативные средства; снотворные и седативные средства, комбинации без барбитуратов</p>	<p>Капсулы с модифицированным высвобождением</p>	<p>Содержит: мелатонин, который оказывает снотворное действие, дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1-рецепторов первого поколения. Вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений и нарушений со стороны нервной системы.</p>
45	<p>НОВЕМА® НАЙТ Дифенгидрамин + Напроксен</p>	M01AE02	<p>Анальгезирующее средство комбинированное (нестероидное противовоспалительное средство + H1- гистаминовых рецепторов блокатор)</p>	<p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>	<p>Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1- рецепторов первого поколения. Сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, головокружение и нарушение зрения.</p>
46	<p>Оку-Оку® Дифенгидрамин + Нафазолин + Цинка сульфат</p>	S01GA51	<p>Противоаллергическое средство</p>	<p>Капли глазные</p>	<p>Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1- рецепторов первого поколения. Сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, головокружение и нарушение зрения.</p>

47	Мигренол® ПМ Дифенгидрамин + Парацетамол	M02BE51	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1- рецепторов первого поколения. Сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, головокружение и нарушение зрения.
48	СПАЗМАЛГОН® ЭФФЕКТ, Пенталгин® Дротаверин + Кофеин + Напроксен +П арацетамол + Фенирамин	Ш02BE71	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит фенираминамалеат - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений
49	Бальзам МОСКОВИЯ® Душицы обыкновенной трава + Пустырника трава + Тысячелистника обыкновенного трава	M)5CM	седативное средство растительного происхождения	Эликсир	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
50	Женьшень настоящего корней настойка	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

51	НЕФРОСТЕН® Золототысячника трава + Любистока лекарственного корня + Розмарина лекарственного листа	O04BX	Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 62% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
52	Офтальмоферон® Интерферон альфа- 2β+Дифенгидрамин	301A005	Противовирусное средство комбинированное (цитокин + H1- гистаминовых рецепторов блокатор)	Капли глазные	Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1- рецепторов первого поколения. Сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, головокружение и нарушение зрения.
53	Ротокан Календулы лекарственной цветков + Ромашки аптечной цветков + Тысячелистника обыкновенного травы экстракт	A01AB11	Противовоспалительное средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь и местного применения	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
54	Календулы лекарственной цветков настойка		Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

55	Каметон Камфора + Хлоробутанол + Эвкалипта шарикового Листьев масло + Левоментол	K02AA20	антисептическое средство	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
56	Кетопрофен, ОКИ, ЛОРЕКЕТ, Кетопрофен-ЛОР Кетопрофен	A01AO11	Препараты, применяемые в стоматологии; другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта	Раствор для полоскания	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
57	Атероклефит® Клевера травы экстракт	C10AX	Гиполипидемическое средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, [жидкий]	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
58	Сантопералгин Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия Парацетамол+ Фенобарбитал	M)2BB72	Анальгезирующее средство комбинированное анальгезирующее опиоидное средство + НПВП + анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + барбитурат	Таблетки	Содержит кодеин - наркотический анальгетик, алкалоид опия фенантренового ряда, агонист опиоидных рецепторов. Головные боли, сонливость, при применении в высоких дозах может ухудшиться координация движений глазных яблок с нарушением зрения, развиться угнетение

59	Конского каштана обыкновенного семян экстракт	C05CX	Вено тонизирующее средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 60% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
60	Триалгин® Кофеин + Метамизол Натрия + Фенобарбитал	M02BB72	анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолон	Таблетки	Содержит фенобарбитал – противоэпилептическое, седативное, снотворное средство группы барбитуратов. Снотворное лекарственное средство с выраженным влиянием на ЦНС
61	Флюофайт, РиниКолд ХотКап®, Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин	M02BE71	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + H1-гистаминовых рецепторов блокатор	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Содержит фенирамина малеат - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений
62	Ринзасип® с витамином С Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + Аскорбиновая кислота	M02BE51	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + H1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Содержит фенирамина малеат - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений

63	Квадрофлю, РиниКолд Макс® Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	R05X	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Таблетки	Содержит хлорфенамин- блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
64	Колдрилиф, Флюфайт® Таб., АджиКолд®, РАНКОФ®, Ринза® Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	N02BE51	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Таблетки	Содержит хлорфенамин - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
65	Колдакт® Дэй Найт Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамини Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин набор	N02BB51	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой	Содержит хлорфенамин - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
66	Флюколдекс®-Н Кофеин + Парацетамол + Хлорфенамин	Ш02BE51	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномимети+ Н1-гистаминовых рецепторов блокатор	Таблетки	Содержит хлорфенамин - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость

67	Колдрекс Капе Кофеин + Парацетамол + Хлорфенамин + аскорбиновая кислота	Ш02BE51	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики, анилиды	Капсулы	Содержит хлорфенамин- блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
68	Леспеплан® Леспедезы двухцветной побег	O04BX	Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
69	Отипакс® Лидокаин + Феназон	302OA30	Средства для лечения заболеваний уха; другие средства для лечения заболеваний уха; анальгетики и анестетики	Капли ушные	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
70	Септалор Лидокаин + Хлоргексидин	K02AA05	Антисептическое средство + местноанестезирующее средство	Спрей для местного применения дозированный, спиртовой со вкусом ментола, лимона	Содержит спирт этиловый 96 % Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

71	Лимонника китайского Семян настойка	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
72	Мелаксен Мелатонин	M35CH01	Адаптогенное средство	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит мелатонин, который оказывает снотворное действие. Вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений и нарушений со стороны нервной системы.
73	СонНорм Дуо Мелатонин + Мята перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт	M)5CX	снотворное средство	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит мелатонин, который оказывает снотворное действие. Вызывает побочные эффекты в виде психических нарушений и нарушений со стороны нервной системы.
74	Мелисон Мелиссы лекарственной травы настойка	Ш05CM09	седативное средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

75	ИНГАЛИПТ, Ингалипт-Н Месульфамид + Мята перечной листьев масло + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта листьев масло	Я02AA20	Противомикробное средство комбинированное	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
76	Гербион® сироп исландского мха экстракт	R05Db	Противокашлевые препараты, исключая комбинации с отхаркивающими препаратами.	Сироп	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
77	Ингалипт Виалайн® Мята перечной листьев масло + Сульфаниламид + Сульфатиазол + Тимол + Эвкалипта листьев масло	K02AA20	Противомикробное средство комбинированное	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 95/96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
78	Мята перечной листьев настойка	A03AX	Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта	Настойка	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

79	Фурацилин спиртовой Нитрофура	B08AP01	Антисептики и дезинфицирующие средства; производные нитрофурана	Раствор для местного и наружного применения, [спиртовой]	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
80	Овса посевного травы настойка		общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
81	Викс День и Ночь Парацетамол + Фенилэфрин + Дифенгидрамин + Парацетамол	N02BE51	ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит дифенгидрамин - блокатор гистаминовых H1- рецепторов первого поколения. Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
82	Колдакт® Хот Дринк, Флюкомп®, ТераФлю от гриппа и простуды Экстра, ТераФлю Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин	N02BE51	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Содержит фенирамина малеат - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений

83	Максиколд® Рино, Инфалган, ГриппоФлю® от простуды и гриппа, Стопгрипан, Звездочка Флю Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин +Аскорбиновая кислота	N02BE51	Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Содержит фенирамина малеат - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений
84	АНТИФЛУ® Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	N02BE51	анальгезирующее ненаркотическое средство + психостимулирующее средство + альфа-адреномиметик + H1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Содержит хлорфенамин - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
85	Колдакт® Флю Плюс Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	N02BE51	Анальгезирующее Ненаркотическое средство + альфа-адреномиметик + H1-гистаминовых рецепторов блокатор	Капсулы с модифицированным высвобождением	Содержит хлорфенамин - блокатор H1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
86	Флюколдекс® Парацетамол + Хлорфенамин	N02BE51	Анальгезирующее Ненаркотическое средство + H1-гистаминовых Рецепторов блокатор	Раствор для приема внутрь	Содержит хлорфенамин - блокатор H1- Гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.

87	ФриКолд КИДС, Антифлу® Кидс, ДезГриппин®, Антигриппин Парацетамол + Хлорфенамин + Аскорбиновая кислота	Ш02BE51	Анальгезирующее Ненаркотическое средство + психостимулирующее Средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых рецепторов блокатор	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Содержит хлорфенамин - блокатор Н1- Гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
88	ДезГриппин®, Антигриппин Парацетамол + Хлорфенамин + Аскорбиновая кислота	Ш02BE51	Анальгезирующее Ненаркотическое средство + психостимулирующее Средство + альфа-адреномиметик + Н1-гистаминовых рецепторов блокатор	Таблетки шипучие	Содержит хлорфенамин - блокатор Н1- гистаминовых рецепторов Может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.
89	Умкалор Пеларгонии сидовидной корней экстракт		Противомикробное средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 11% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
90	Пиона уклоняющегося травы, корневищ и корней настойка	M05CM	психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

91	<p>Проспан Плюща обыкновенного листьев экстракт</p>	Я05СА	<p>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</p>	<p>Раствор для приема внутрь</p>	<p>Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
92	<p>Гербион® сироп Плюща обыкновенного листьев экстракт</p>	Я05СА12	<p>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</p>	<p>Сироп</p>	<p>Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
93	<p>Стоптуссин ФИТО Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + Тимьяна обыкновенного травы экстракт +Тимьяна ползучего травы экстракт</p>	Я05Х	<p>Отхаркивающее средство растительного происхождения</p>	<p>Сироп</p>	<p>Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
94	<p>Эвкабал® Подорожника экстракт жидкий + Тимьяна экстракт жидкий</p>	К05СА10	<p>Отхаркивающее средство Растительного происхождения</p>	<p>Сироп</p>	<p>Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>

95	Полыни горькой травы настойка	A15	Аппетита стимулятор Растительного происхождения (горечь)	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
96	Пропосол Прополис	A01AЕН1	Регенерации тканей стимулятор	Спрей для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
97	Прополис Прополиса настойка	УОЗАХ	Прочие лечебные средства	Настойка для ингаляций, местного и наружного применения	Содержит спирт этиловый 80% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
98	Пустырника травы настойка	M)5СМ	психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

99	Родиолы розовой корневищ и корней экстракт	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
100	Азулан Ромашки аптечной цветков экстракт	A01AB11	Противовоспалительное средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения	Содержит спирт этиловый 50% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
101	Сабельника болотного корневищ настойка	M01	Противовоспалительное средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
102	Сангвиритрин®, Сангвилар® Сангвинарина гидросульфат + Хелеритри на гидросульфат	E)08AX	Противомикробное средство растительного происхождения	Раствор для местного и наружного применения, [спиртовой]	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

103	Солодки сироп Солодки корней экстракт	K05CA	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях	Сироп	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
104	Кедростат Сосны кедровой сибирской семян настойка	A05C	Гепатопротекторное средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
105	ОРВИС® Бронхо Тимьян, Бронхохелп® Тимьяна обыкновенного травы экстракт	K05CA	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях	Сироп	Содержит спирт этиловый 95%, 45% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
106	Чабреца экстракт жидкий Тимьяна ползучего трава		Отхаркивающее средство растительного происхождения	Сырье растительное- экстракт жидкий	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

107	<p>ПЕРТУССИН-Ч, Пертуссин-ЭКОлаб Тимьяна ползучего травы экстракт + Калия бромид</p>	K05CA	Отхаркивающее средство	Сироп	<p>Содержит спирт этиловый 80%, 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
108	<p>Валосердин® Фенобарбитал + Этилбром изовалерианат</p>	M05CM	Другие снотворные и седативные средства	Капли для приема внутрь	<p>Содержит спирт этиловый 96%, фенобарбитал Снотворное лекарственное средство, хорошо растворимое в спирте, с выраженным влиянием на ЦНС</p>
109	<p>Отинум Холина салицилат</p>	802ЭА	Нестероидный противовоспалительный препарат	Капли ушные	<p>Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
110	<p>Хлорофиллипт® Эвкалипта листьев экстракт</p>	Э06ВХ	Противомикробное средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	<p>Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>

111	Эвкалипта прутовидного листьев настойка	K02AA20	Антисептическое Средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
112	Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
113	Эхинацеи пурпурной травы настойка	Б03АХ	Иммуностимулирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
114	Оригинальный Большой бальзам Биттнера® Травяной бальзам	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Бальзам для приема внутрь и наружного применения	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

115	Бальзам "Первопрестольный"® Эликсир из смеси растительного сырья		Растительного происхождения средство	Эликсир	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
116	Ново-Пассит® Ново-Пассита экстракт жидкий	K05CX	Снотворные и седативные (успокаивающие и снижающие нервное напряжение в организме) препараты (исключая барбитураты) в комбинации с другими препаратами	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
117	Доктор Тайсс Эхинацея форте Сок эхинацеи пурпурной	Б03АХ	Иммуномодулирующее средство	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
118	Лома Люкс Псориасис Гомеопатическое средство		Гомеопатическое средство	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

119	Эхинацин® Ликвидум Эхинацеи пурпурной травы сок	Б03АХ	Иммуностимулирующее средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
120	Протефлазид® Экстракт жидкий из смеси растительного сырья	J05	Противовирусное средство растительного происхождения	Раствор для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
121	Эвкалимин® Эвкалипта прутовидного листьев препарат	D08АХ	Противомикробное средство растительного происхождения	Раствор для местного применения и ингаляций, спиртовой	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
122	Стоматофит® эксперт Экстракт жидкий из смеси растительного сырья	A01AD11	Противовоспалительное средство растительного происхождения	Спрей для местного применения	Содержит: экстрагент - этанол 70%; вспомогательное вещество - этанол 96 % Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

123	Сальвин-ВИФ Шалфея лекарственного листьев экстракт	E08AX	Антисептическое средство растительного происхождения	Раствор для местного применения, спиртовой	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
124	Пародонтоцид Препарат из смеси масел растительных		Противовоспалительное средство растительного происхождения	Раствор для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
125	Гентос® Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 43% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
126	Пумпан® Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 43% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

127	Галстена® Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 43% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
128	Афлубин® Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 43% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
129	Ременс® Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 43% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
130	Цефалис Эдас-109 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

131	Фитангин Эдас-105 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
132	Кардиалгии ЭДАС- 106 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
133	Карсат Эдас-136 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
134	Аркальцит Эдас- 142 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

135	Менолет Эдас-139 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
136	Пародол ЭДАС-122 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
137	Кантацит Эдас-140 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие , наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
138	Нефронал Эдас-128 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

139	Аллергопент Эдас- 130 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
140	Бронхолат Эдас- 118 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
141	Урситаб Эдас-132 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
142	Меркур Эдас-134 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

143	Чистел Эдас-110 Гомеопатическое средство		средство растительного происхождения	Капли гомеопатические	Содержит спирт этиловый 30% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
144	Подорожника большого листьев настойка	K05CJ1	отхаркивающее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
145	Герботон Настойка из смеси растительного сырья	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
146	Зверобоя продырявленного травы настойка		Вязущее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

147	Седофлор® Настойка из смеси растительного сырья	M)5CM	седативное средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
148	Чеснока настойка		Антибактериальное, противогрибковое средство	Настойка	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
149	Ландыша травы настойка	C01EB	Кардиотоническое средство - сердечный гликозид	Настойка	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
150	Содекор® Настойка из смеси растительного сырья		общетонизирующее средство растительного происхождения	Настойка	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

151	<p>ФИТОГАЛЕНИКА ® Экстракт жидкий из смеси растительного сырья</p>		<p>общетонизирующее средство растительного происхождения</p>	<p>Экстракт для приема внутрь, жидкий</p>	<p>Содержит спирт этиловый 38-45% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
152	<p>Пантокрин Пантов оленя благородного экстракт</p>	A13A	<p>общетонизирующее средство растительного происхождения</p>	<p>Экстракт для приема внутрь, жидкий</p>	<p>Содержит спирт этиловый 50% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
153	<p>Стоматофит® А Экстракт жидкий из смеси растительного сырья + Бензокаин</p>	A01AEI1	<p>Противовоспалительное средство растительного происхождения</p>	<p>Экстракт для местного применения</p>	<p>Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
154	<p>Югланэкс Экстракт жидкий грецкого ореха плодов свежих</p>	A13A	<p>Противовоспалительное, антиоксидантное, общетонизирующее средство</p>	<p>Экстракт для приема внутрь, жидкий</p>	<p>Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>

155	Экстракт жидкий эхинацеи пурпурной травы	Б03АХ	Иммуностимулирующее средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, жидкий	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
156	Леспефлан Леспедезы двухцветной побеги	О04ВХ	Гипоазотемическое средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, жидкий	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
157	Фито Ново-Сед® Экстракт жидкий из смеси растительного сырья	М05СМ	седативное средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь	Содержит спирт этиловый 40% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
158	Крапивы экстракт жидкий		гемо статическое средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, [жидкий]	Содержит спирт этиловый 50% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

159	ПростаНорм® Экстракт жидкий из смеси растительного сырья	O04BX	Простатита хронического средство лечения растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, [жидкий]	Содержит спирт этиловый 50% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
160	Левзеи сафлоровидной корневища с корнями экстракт жидкий	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Экстракт для приема внутрь, [жидкий]	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
161	Стоматофит® Экстракт жидкий из смеси растительного сырья	A01AШ1	Противовоспалительное средство растительного происхождения	Экстракт для местного применения	Содержит спирт этиловый 70% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
162	КЕДРОВИТ® Аронии черноплодной плоды + Березы почки + Боярышника плоды + Боярышника цветки + Сосны кедровой сибирской орех+Мед	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Эликсир	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

163	<p>Эхинокор Эхинацеи пурпурной трава, Березы листья, Солодки корни, Шиповника коричного плоды</p>	Б03АХ	<p>Иммуностимулирующее средство растительного происхождения</p>	Эликсир для приема внутрь	<p>Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
164	<p>Клиофит® Эликсир из смеси растительного сырья</p>		<p>Седативное Средство растительного происхождения с общеукрепляющим действием</p>	Эликсир	<p>Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
163	<p>Демидовский® эликсир Эликсир из смеси растительного сырья</p>	А05А	<p>желчегонное средство растительного происхождения</p>	Эликсир	<p>Содержит спирт этиловый Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>
166	<p>Бронхофит Эликсир из смеси растительного сырья</p>	К05С	<p>Бронходилатирующее средство растительного происхождения</p>	Эликсир	<p>Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.</p>

167	Эвалар Эликсир из смеси растительного сырья	A13A	общетонизирующее средство растительного происхождения	Эликсир	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
168	Бронхikum® ТП Первоцвета корневищ с корнями Экстракт + Тимьяна травы экстракт	K05CA10	отхаркивающее средство растительного происхождения	Эликсир	Содержит спирт этиловый 90% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
169	Алтайский эликсир Эликсир из смеси растительного сырья	A13A	Общетонизирующее средство растительного происхождения	Эликсир	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
170	Каланхоэ сок Каланхоэ побеги свежие		Репарации тканей стимулятор растительного происхождения	Раствор для местного и наружного применения, спиртовой	Содержит спирт этиловый 95% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.

171	Парадонтоцид Тимол + Фенилсалицилат + Эвгенол+ масло гвоздичное + масло шалфея мускатного+ масло мяты+ фторид натрия		Противовоспалительное средство растительного происхождения	Раствор для местного применения	Содержит спирт этиловый 96% Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций.
-----	--	--	---	---------------------------------------	---

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
УХУДШАЮЩИХ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА УПРАВЛЕНИЕ/ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ,
ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№	Торговое наименование Международное непатентованное наименование	АТХ	Группа	Лекарственная форма	Примечание
1	Атропин	S01 PA01	м-холиноблокатор	капли глазные	В течение 2 ч после исследования (закапывания) запрещено управление ТГ, в период лечения необходимо воздержаться от управления транспортным средством.

2	Бипериден	N04AA02	Холиноблокатор центральный	таблетки	Прием препарата может нарушить способность управления автомобилем и работы с механизмами.
3	Вальпроевая кислота	N03 AGO 1	Производные жирных кислот	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, сироп, капли для приема внутрь, раствор для внутривенного введения	Вождение и управление транспортными средствами противопоказано. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается вальпроевая кислота, не допускаются к управлению ТС.
4	Вориконазол	J02AC03	Противомикробные препараты для системного использования	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Может вызвать преходящие и обратимые нарушения зрения, включая возникновение "пелены" перед глазами, при наличии таких симптомов - избегать управления транспортным средством. При приеме препарата пациенты не должны водить по ночам.
5	Габапентин	N03 AX 12	Прочие противоэпилептические препараты	капсулы	Во время приема препарата пациентам не рекомендуется управлять транспортными средствами. Габапентин влияет на ЦНС и может вызвать головокружение, сонливость, спутанность сознания, потерю сознания или другие симптомы со стороны ЦНС.

6	Дексмететомидин	Ш05СМ18	Прочие снотворные и седативные препараты	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами.
7	Ипидакрин	N06DA05	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	раствор для внутримышечного и подкожного введения	Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами.
8	Карбамазепин	Ц03АР01	противоэпилептическое средство	таблетки, таблетки с пролонгированным высвобождением	Пациенту следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и механизмами, так как при приеме снижается быстрота реакций, а так же риск возникновения НР (головокружение, сонливость, атаксия, диплопия, нарушение аккомодации, нарушение зрения).
9	Клемастин	K06AA04	Антигистаминные препараты для системного применения	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами

10	Клонидин	C02AC01	Гипотензивное средство центрального действия	таблетки, капли глазные, раствор для внутривенного введения	Выраженное седативное действие. В период лечения не следует управлять транспортным средством
11	Лакосамид	ШЗАХ18	противоэпилептическое средство, прочие противоэпилептические средства	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, раствор для приема внутрь, сироп, раствор для инфузий	Следует воздержаться от управления транспортными средствами и от занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается лакосамид, не допускаются к управлению ТС.
12	Ламотриджин	N03AX09	Прочие противоэпилептические препараты	таблетки, таблетки диспергируемые	Имеются сообщения о нежелательных реакциях ламотриджина неврологического характера, таких как головокружение и диплопия, поэтому, прежде чем сесть за руль транспортного средства, пациенты должны оценить влияние ламотриджина на свое состояние.
13	Леветирацетам	ЖЗАХ14	Прочие противоэпилептические препараты	раствор для приема внутрь, таблетки, покрытые пленочной оболочкой	В силу различной индивидуальной чувствительности к препарату со стороны центральной нервной системы в период лечения необходимо воздержаться от вождения транспортным средством. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается летирацетам, не допускаются к управлению ТС.

14	Линезолид	ЛИХХ08	Противомикробные препараты для Системного использования	раствор для инфузий	Препарат может вызывать головокружение и нарушения зрения и, соответственно, влиять на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
15	Лития карбонат	N05AN01	Литий	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Следует отказаться от управления транспортными средствами, так как некоторые побочные эффекты на ЦНС (сонливость), могут отрицательно влиять на способность управления транспортным средством.
16	Лорноксикам	M01AC05	Препараты для лечения Костно-мышечной системы	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	При появлении головокружения или сонливости, следует воздержаться от управления транспортными средствами.
17	Мебгидролин	R06AX15	Прочие антигистаминные препараты для системного применения	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, драже, таблетки	В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами

18	Метамизол Натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид	N02BB52	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	При появлении головокружения или нарушения аккомодации, следует воздержаться от управления транспортными средствами.
19	Метилдопа	C02AB01	Гипотензивное средство центрального действия	таблетки	Выраженное седативное действие в начале лечения. В этот период не следует управлять транспортным средством.
20	Неостигмина метилсульфат	NN7AA01	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	раствор для инъекций	В период лечения возможно возникновение головокружения, сонливости и нарушения зрения, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
21	Окскарбазепин	N03AP02	противоэпилептическое средство	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема внутри;	При приеме препарата могут наблюдаться головокружение, сонливость, расстройство координации движений (атаксия), двоение в глазах (диплопия), нечеткость зрения, нарушения зрения, снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия), и угнетение сознания или другие нарушения со стороны ЦНС, При проявлении описанных выше нежелательных явлений следует от управления транспортными средствами и механизмами.

22	Олопатадин	801GX09	Прочие противоаллергические препараты	капли глазные	Сразу после применения препарата возможно ощущение затуманивание зрения. Не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами, пока ваше зрение не станет ясным.
23	Перампанел	N03AX22	противоэпилептическое средство	таблетки, покрытые пленочной оболочкой;	Препарат может вызывать головокружение или сонливость, особенно в начале лечения. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается перампанел, не допускаются к управлению ТС.
24	Прегабалин	N03AX16	Прочие противоэпилептические препараты	капсулы	Прегабалин может вызвать головокружение и сонливость и, соответственно, повлиять на способность управлять автомобилем и пользоваться сложной техникой. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается прегабалин, не допускаются к управлению ТС.
25	Рisperидон	N05AX08	Прочие антипсихотические препараты	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Препарат может в небольшой или умеренной степени оказывать воздействие на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается рisperидон, не допускаются к управлению ТС.

26	Ропинирол	N04BC04	Стимуляторы дофаминергической передачи в ЦНС	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения может возникать головокружение или спутанность сознания, сонливость, внезапное засыпание. Не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами, если у Вас возникли такие нежелательные реакции - существует риск развития серьезных травм или летального исхода с участием пациента или окружающих.
27	Селегилин	N04BD01	Ингибиторы моноаминоксидазы типа В	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения препарат может оказывать влияние на быстроту реакции и ухудшать способность к управлению транспортными средствами. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
28	Тизанидин	M03BX02	Миорелаксант центрального действия	капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки	В период лечения может возникать головокружение и слабость, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
29	Толтеродин	G04BD07	Спазмолитики	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения может вызывать нарушения аккомодации и снижать скорость психомоторных реакций. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.

30	Топирамат	N03AX11	Прочие противоэпилептические препараты	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Топирамат действует на центральную нервную систему и может вызывать сонливость, головокружение и другие симптомы. Он также может вызвать нарушение зрения. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается топирамат, не допускаются к управлению ТС.
31	Транексамовая кислота	B02AA02	Препараты, влияющие на кровообразование и кровь	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, раствор для внутривенного введения	В период лечения препарат может вызывать головокружение и нарушения зрения, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
32	Тригексифенидил	Ц04AA01	Третичные амины	таблетки	В период лечения препарат может вызывать головокружение и галлюцинации, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
33	Тропикамид (+комбинации)	B01PA06	м-холиноблокатор	капли глазные	В период лечения препарат может вызывать сонливость, затуманивание зрения, чувствительность к свету, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.

34	Фезотеродин	G00BD11	Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения препарат может вызывать нечеткость зрительного восприятия, сонливость и чувство усталости, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
35	Фенилэфрин	B01PB01	Симпатомиметики (исключая противоглаукомные препараты)	капли глазные	При применении препарата вследствие изменения аккомодации и ширины зрачка возможно снижение остроты зрения. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
36	Хлоропирамин	Я06АС03	Антигистаминные препараты для системного применения	таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения	В период лечения препарат может вызывать сонливость, утомляемость и головокружение, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
37	Циклопентолат (+комбинации)	S01PA04	м-холиноблокатор	капли глазные	На фоне применения препарата могут возникать слабость, тошнота, головокружение, снижение остроты зрения, которые негативно влияют на способность управлять транспортным средством. Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.

38	Этамбутол	J04AK02	Противотуберкулезный препарат	таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения препарат может вызывать нарушения зрения (уменьшение остроты зрения, ограничение полей зрения, нарушение цветоощущения по отношению к зеленому и красному цвету). Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
39	Этосуксимид	K03AL01	Производные сукцинимиды	капсулы	Реактивность может изменяться до такой степени, что способность к вождению нарушается, поэтому пациентам, получающим этосуксимид, следует воздержаться от вождения транспортных средств. Лица, страдающие заболеваниями, при которых назначается этосуксимид, не допускаются к управлению ТС.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
УХУДШАЮЩИХ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ,
ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ**

№	Торговое наименование Международное непатентованное наименование	АТХ	Группа	Лекарственная форма	Примечание
---	---	-----	--------	---------------------	------------

1	Амбризентан	C02KX02	Прочие антигипертензивные препараты	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта
2	Адеметионин	A16AA02	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой	У некоторых пациентов при приеме адеметионина может возникнуть головокружение. Не рекомендуется водить автомобиль и работать с механизмами во время приема препарата до тех пор, пока пациент не будет уверен, что терапия не влияет на способность заниматься подобного рода деятельностью.
3	Алимемазин	R06AD01	Антигистаминные препараты для системного применения	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, раствор для внутримышечного введения	На фоне лечения препаратом не следует заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами).
4	Амиодарон	C01BB01	Антиаритмические препараты, 3 тип	таблетки, концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, раствор для внутривенного введения	в период лечения следует воздерживаться от управления транспортным средством и занятий потенциально опасными видами деятельности

5	Атенолол	C07AB03	Антиаритмические препараты, 2 тип	таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой	в период лечения следует воздерживаться от управления транспортным средством и занятий потенциально опасными видами деятельности
6	Атомоксетин	N06BA09	Симпатомиметик центрального действия. Препарат, улучшающий метаболизм головного мозга	капсулы	прием препарата часто может сопровождать чувством усталости и сонливости, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
7	Ацитретин	B05BB02	Ретиноиды для лечения псориаза	капсулы	ухудшение зрения в условиях пониженного освещения, в сумерках и ночью, необходимо проявлять осторожность при управлении транспортным средством в темное время суток
8	Бромокриптин	C02CB01; M)4BC01	Ингибиторы секреции пролактина; Стимуляторы допаминовых рецепторов	таблетки	Необходимо соблюдать особую осторожность при управлении транспортными средствами

9	Варениклин	Ы07BA03	Препараты, применяемые при никотиновой зависимости	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Незначительное или умеренное влияние, при возникновении побочных эффектов воздержаться от управления транспортными средствами
10	Гидрокортизон+[Лидокаин]	H02AB09	Глюкокортикоиды	суспензия для внутрисуставного и околосуставного введения	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
11	Дексаметазон	H02AB02	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	раствор для инъекций, таблетки, капли глазные, капли глазные и ушные	Учитывая вероятность развития побочных симптомов со стороны центральной нервной системы, в период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и работе с движущимися механизмами
12	Дигоксин	C01AA05	Кардиотонические средства	таблетки, раствор для внутривенного введения	в период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами

13	Диклофенак	M01AB05	Нестероидный противовоспалительный препарат	раствор для внутримышечного введения, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, капсулы	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
14	Диметинден	EЮ4AA13	Антигистаминные препараты для системного применения	гель для наружного применения, капли для приема внутрь, эмульсия для наружного применения, капсулы пролонгированного действия	Обладает незначительным седативным эффектом, может ослаблять внимание, поэтому следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
15	Доксициклин	Д)1AA02	Противомикробные препараты для системного использования	таблетки диспергируемые, капсулы, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	В случае развития головокружения, нечеткости зрения или двоения в глазах, следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания.
16	Донепезил	M36OA02	Ингибиторы холинэстеразы	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Оказывает влияние на психофизические способности, решение об управлении транспортным средством принимается врачом

17	Ибупрофен	M01AE01	Противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; производные пропионовой кислоты	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Пациентам, отмечающим головокружение, сонливость, заторможенность или нарушение зрения при приеме ибупрофена, следует избегать вождения автотранспорта или управления движущимися механизмами
18	Изосорбида мононитрат	C03AA14	Органические нитраты	таблетки; капсулы; таблетки пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
19	Иксекизумаб	B04AC13	Иммунодепрессивный препарат. Антагонист рецепторов интерлейкинов	раствор для подкожного введения	Оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами При возникновении слабости, головокружения следует отказаться от управления транспортным средством
20	Индометацин	M01AB01	Нестероидный противовоспалительный препарат	таблетки пролонгированного действия	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности

21	Канаглифлози н	A10BK02	Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Существует риск развития гипогликемии, постурального головокружения, что ухудшает способность управлять транспортным средством
22	Кеторолак	M01AB15	Нестероидный противовоспалительный препарат	раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки, покрытые пленочной оболочкой	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности
23	Кетотифен	K06AX17	Прочие антигистаминные препараты для системного применения	таблетки, сироп	В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами
24	Клиндамицин	J01FF01	Противомикробные препараты для системного использования	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	При возникновении побочных эффектов (головокружения и расслабления скелетной мускулатуры) воздержаться от управления транспортными средствами.

25	Ланреотид	H01 CBO3	Аналог соматостатина	гель для подкожного введения пролонгированного действия	Прием препарата часто может сопровождать чувством усталости и сонливости, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
26	Левосетиризин	R06AE09	Антигистаминные препараты для системного применения	капли для приема внутрь, таблетки покрытые пленочной оболочкой	Учитывая возможную повышенную сонливость, в период лечения необходимо воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, в т.ч. от управления транспортными средствами
27	Леналидомид	L04AX04	Иммунодепрессивные средства	капсулы	При возникновении слабости, головокружения следует отказаться от управления транспортным средством
28	Лидокаин	M01BB02	Препараты для местной анестезии Препараты для лечения заболеваний нервной системы	раствор для инъекций	В период лечения, из-за возможных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами

29	Линкомицин	JO1FF02	Противомикробные препараты для системного использования	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	Нельзя исключить появление головокружения и расслабления скелетной мускулатуры, поэтому вождение транспортного средства не рекомендуется.
30	Лираглутид	A10SH02	Гипогликемический препарат. Агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида	раствор для подкожного введения	Существует риск возникновения головокружения, гипогликемии, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
31	Мелатонин	N05CH01	Агонисты Мелатониновых рецепторов	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Следует воздержаться от вождения транспортных средств. При появлении сонливости воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами
32	Мемантин	N06DX01	Блокатор глутаматных NMD A-рецепторов. Препарат для лечения деменции	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	У пациентов с болезнью Альцгеймера на стадии умеренной и тяжелой деменции обычно нарушена способность к вождению автотранспорта и управлению сложными механизмами. Мемантин может вызвать изменение скорости реакции, поэтому следует воздержаться от управления автотранспортом и работы со сложными механизмами. Следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и управлении механизмами.

33	Менадиона натрия бисульфит	B02BA02	витамина К аналог синтетический	таблетки	В период применения препарата не рекомендуется управление транспортными средствами и различными механизмами, а также осуществление других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций
34	Метамизол натрия	M32BB02	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	Учитывая возможное нежелательное влияние препарата в период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами.
35	Метамизол натрия+Хинин	Б02В	Анальгетики и антипиретики	таблетки	В период приема препарата не следует заниматься вождением автотранспорта, так как имеется риск снижения способности к концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
36	Метоклопрами Д	A03BA01	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения	Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами во время приема препарата, так как прием препарата может вызывать сонливость и дискинезию.

37	Метотрексат	ШПЗ^01	Аналоги фолиевой кислоты	таблетки, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	учитывая возможные побочные эффекты, например, повышенная утомляемость, сонливость, головная боль и спутанность сознания, следует соблюдать осторожность при управлении транспортным средством и занятиях требующих внимания
38	Метформин	A10BA02	Бигуаниды	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; Таблетки с пролонгированным высвобождением	Применение метформина не вызывает гипогликемию и не влияет на способность к управлению ТС и обслуживанию механизмов. Возможно развитие гипогликемии при одновременном приеме других сахароснижающих средств (производные сульфонилмочевины, инсулин, репаглинид и др.)
39	Нимесулид	M01AX17	Нестероидный противовоспалительный препарат	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Пациентам, испытывающим после приема нимесулида ощущение оглушенности, головокружение или сонливость, следует воздержаться от управления транспортными средствами
40	Нитроглицерин	C0ЮA02	Периферический вазодилататор. Антиангинальный препарат	таблетки подъязычные	При лечении возможно снижение двигательной активности, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами

41	Окрелизумаб	Ю4АА36	Иммуномодулятор. Препарат, применяемый при рассеянном склерозе	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять ТС и работать с механизмами. Лечащий врач сообщит, влияет ли течение рассеянного склероза на Вашу способность водить машину и безопасно управлять другими ТС и механизмами
42	Оксибутинин	С04В004	Спазмолитики	таблетки	Может вызывать сонливость и нечеткость зрения. При появлении сонливости или нечеткости зрения следует воздержаться от управления ТС и работы с механизмами
43	Омепразол	А02ВС01	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	капсулы кишечнорастворимые, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	В период лечения может возникать головокружение, сонливость, нарушение зрения, поэтому следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и выполнении других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
44	Пантопризол	А02ВС02	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	Следует воздержаться от управления транспортными средствами и другими механизмами, требующими повышенного внимания, из-за вероятности развития головокружения и нарушения зрения.

45	Платифиллин	АОЗАХ	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	таблетки, раствор для подкожного введения	В период лечения необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.
46	Преднизолон	H02AB06	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	раствор для внутривенного и внутримышечного введения, раствор для инъекций, таблетки, мазь для наружного применения,	Во время лечения пациентам рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
47	Прометазин	Я06A002	Антигистаминные препараты для системного применения	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	В начальной стадии лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности. В дальнейшем степень ограничений определяют в зависимости от индивидуальной переносимости
48	Пэг-интерферон альфа 2Ь Пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)	Б0ЗАВЮ	Интерферон. Иммуномодулирующий препарат с противовирусным действием	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, раствор для подкожного введения	При возникновении слабости, головокружения следует отказаться от управления транспортным средством

49	Рабепразол	A02BC04	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, капсулы кишечнорастворимые, таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	В случае развития таких нежелательных реакций, как головокружение, рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами и механизмами, а также от занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
50	Разагилин	M)4VB02	Ингибиторы моноаминоксидазы Типа В	таблетки	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами. Пациенты с сонливостью и испытавшие внезапное засыпание не должны управлять автотранспортом и заниматься потенциально опасными видами деятельности.
51	Ранолазин	C01EB18	Антиангинальный препарат	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	Препарат может вызывать такие нежелательные реакции, как головокружение, нечеткость зрения, двоение в глазах, состояние спутанности сознания, галлюцинации, нарушения координации, что может повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работы с механизмами.
52	Риоцигуат	C02KX05	Прочие антигипертензивные препараты	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Головокружение как распространенная нежелательная реакция может влиять на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Следует соблюдать осторожность.

53	Ромиплостим	B02BX04	Стимулятор тромбопоэза	порошок для приготовления раствора для подкожного введения	При возникновении слабости, головокружения следует отказаться от управления транспортным средством
54	Сибутрамин	A08AA10	Препарат для лечения ожирения центрального действия	капсулы	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
55	Сибутрамин + метформин	A08AA10	Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)	капсулы	Внесен в список как препарат, содержащий сибутрамин, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
56	Силденафил	C04BE03	Средства при эректильной дисфункции	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Незначительное влияние, необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами

57	Солифенацин	C04B008	Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Может вызывать нечеткость зрительного восприятия, сонливость и чувство усталости. Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами.
58	Тиоктовая кислота	A16AX01	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	концентрат для приготовления раствора для инфузий, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, покрытые оболочкой	При приеме препарата могут возникать нежелательные реакции (головокружение, головная боль, расстройство зрения, тошнота). Соблюдайте осторожность при управлении транспортными средствами и механизмами, а также занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты реакций.
59	Троспия хлорид	G04BD09	Спазмолитики	таблетки	В начале лечения, при увеличении дозы, замене препарата, а также при взаимодействии с алкоголем возможно ухудшение зрения, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и работе с механизмами* Может вызвать нарушения зрения (нарушение аккомодации) - рекомендуется соблюдать осторожность при управлении ТС и механизмами
60	Фамотидин	A02BA03	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, таблетки покрытые пленочной оболочкой	Пациентам следует соблюдать осторожность при выполнении работ, требующих быстроты психомоторных реакций (в т.ч. при управлении автотранспортом и работе с техникой), поскольку во время лечения может возникать головокружение и наблюдаться повышенная утомляемость.

61	Цетиризин	R06AE07	Антигистаминные препараты для системного применения	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капли для приема внутрь	Может вызвать сонливость, утомляемость, головокружение. При подобных реакциях не следует управлять ТС и работать с механизмами
62	Цефазолин	J01DB04	Противомикробные препараты для системного использования	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	На фоне применения цефазолина возможно развитие таких побочных эффектов, как тошнота, рвота, головокружение и судороги, следует соблюдать осторожность при управлении транспортным средством и воздержаться в случае развития указанных нежелательных явлений.
63	Цефотаксим + Сульбактам	J01DD51	Противомикробные препараты для системного использования	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	При применении препарата возможно развитие таких нежелательных реакций, как головокружение, может нарушаться способность к концентрации внимания и реакциям. Соблюдайте осторожность в период лечения при управлении транспортными средствами, работе с механизмами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.
64	Цефтриаксон	J01DD04	Противомикробные препараты для системного использования	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для инфузий	Во время лечения цефтриаксоном следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами в связи с возможностью возникновения головокружения и других нежелательных реакций, которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами, механизмами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций

65	Циклоспорин	L04AD01	Ингибиторы кальциневрина	капсулы, концентрат для приготовления раствора для инфузий, раствор для приема внутрь	Учитывая возможные побочные эффекты, например, спутанность сознания, дезориентация, заторможенность, нарушение зрения - следует соблюдать осторожность при управлении транспортным средством
66	Цинакальцет	H05BX01	Антипаратиреоидный препарат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Может вызывать головокружение и судороги, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами
67	Циталопрам	M)6AB04	Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина	таблетки покрытые пленочной оболочкой	В период лечения препаратом пациентам не рекомендуется управлять автомобилем или механизмами.
68	Эзомепразол	A02BC05	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	капсулы кишечнорастворимые, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	В связи с тем, что во время применения препарата Эзомепразол могут возникать такие нежелательные реакции, как головокружение, нечеткость зрения и сонливость, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы захотите выполнять эти действия.

69	Эмпаглифлозин	A10BK03	Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Незначительное влияние. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с инсулином и препаратами сульфонилмочевины
70	Этамзилат	B02BX01	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	раствор для инъекций, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	В связи с возможными побочными действиями препарата, в период лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
71	Эфедрин	C01CA26	Адрено- и допаминиметики	раствор д/инъекций	В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами